

# CO<sub>2</sub>/Hiilidioksidi-laserhoidon potilasohje

Hiilidioksidi-laserhoito tehdään paikallispuudutuksessa ja sitä ennen voi syödä, juoda ja ottaa lääkkeit normaalisti. Hoidetuille alueille jää pinnalliset haavaumat, joihin laitetaan antibioottivoidetta.

## Huomioitavaa ennen hoitoa

Mikäli teillä on aktiivinen tai tiheästi uusiva herpes, ottakaa yhteyttä Ihosairaalaan etukäteen herpesen hoitamiseksi.

## Huomioitavaa hoidon jälkeen

Kipulääkettä voi käyttää tarpeen mukaan. Hoidetut alueet suihkutetaan päivittäin runsaalla vedellä ja alueille laitetaan antibioottivoidetta, kunnes ne rupeutuvat. Pinnallinen haavauma kuivahtaa noin viikon kuluttua ruveksi, joka irtoa itsekseen parin viikon kuluessa. Saunomista ja uimista vältetään, kunnes alueet ovat parantuneet.

Hoitoalueet on suojattava auringonvalolta kahden kuukauden ajan toimenpiteen jälkeen. Tähän käytetään korkeakertoimista aurinkosuojavoidetta (suojakerroin SPF50). Hoidetut ihoalueet on suojattava myös pilvisellä säällä.

## Ota rohkeasti yhteyttä

Mikäli paranemisessa ilmeni mitään ongelmaa tai teille herää kysymyksiä aiheeseen liittyen, ottakaa herkästi yhteyttä Ihosairaalaan, 010 419 2000 tai asiakaspalvelu@ihosairaala.fi.