

Ohjeita leikkaukseen tulevalle

Leikkaus tehdään paikallispuudutuksessa. Leikkausta varten ei tarvitse olla ravinnotta, vaan voitte syödä ja juoda normaalisti.

Leikkauspäivänä on suositeltavaa käydä suihkussa ja pestä hiukset, koska toimenpiteen jälkeen on 2-7 päivän pesurajoitus. Älkää laittako mitään meikkiä.

Mikäli käytätte verenohennuslääkkeitä (Aspirin, Disperin, Primaspan tai vastaavia), lääkitys on hyvä lopettaa viikkoa ennen leikkausta. Lääkkeen voi aloittaa uudelleen heti toimenpiteen jälkeisenä päivänä. Kuitenkin mikäli teillä on ollut aivoverenkierron häiriöitä (TIA-kohtauksia, aivoinfarkti) tai sepelvaltimotaudin oireita (sydäninfarkti tai rasitukseen liittyviä rintakipuja), on syytä tarkistaa hoitavalta lääkäriltänne tautustusta.

Mikäli teillä on käytössä veren hyytymistä estävä Marevan-lääkitys, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä teitä hoitavaan lääkäriin. Lääkityksen tehon seurannassa käytettävän kokeen (INR) arvon olisi hyvä olla 2, jotta välttyttäisiin hankalilta verenvuodoilta leikkauksen jälkeen.

Pitäkää neljän viikon tauko ennen suunniteltua toimenpidettä omega-3 kapselien, kalaöljykapselien ja luontaistuotteiden käytössä.

Ota rohkeasti yhteyttä

Jos jokin asia mietityttää ja teille herää kysymyksiä tulevaan toimenpiteeseen liittyen, voitte ottaa yhteyttä Ihosairaalaan, 010 419 2000 tai asiakaspalvelu@ihosairaala.fi.